

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 14040026 Назва сорту: ІНВ1066 Заявник (код): 1991 Власник сорту (код): 1991

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180337

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	26,3	31,4	18,8
± до усередненої урожайності, ц/га	5,9	0,8	-7,6
± до усередненої урожайності, %	29	3	-29
Стійкість до вилягання, бал	9	8,2	9
Стійкість до посухи, бал	8	8,2	8,8
Стійкість до осипання, бал	8	7,4	7,2
Зимостійкість, бал	8	7,7	8
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8	8,6	7,2
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	8,4	6,2
Стійкість до бактеріозу, бал	9	8,6	6,8
Стійкість до пероноспорозу, бал	8	8,6	6
Вміст білка, %	24,2	21,6	20,3
Вміст олії, %	45,6	48,3	49,4
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.