

Вид: Троянда *Rosa L.*

Заявка № 22339004 Назва сорту: СКХ09927 **Заявник (код):** 2690 **Власник сорту (код):** 2690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.09.2022 **Патент №** 220590

Дата пріоритету: 30.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.09.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220542

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|----------------------------|-----|---------------|
| 1 | Рослина: тип росту | клумбовий | 3 | |
| 2 | Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів) | прямий | 1 | |
| 3 | Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння) | середня | 5 | до високої |
| 4 | Молодий пагін: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 5 | Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення | середня | 5 | |
| 6 | Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина) | відсутні | 1 | до малої |
| 7 | Шипи: домінуюче забарвлення | червонувате | 3 | |
| 8 | Листок: розмір | великий | 7 | |
| 9 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 7 | |
| 10 | Листок: антоціанове забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 11 | Листок: глянуватість верхнього боку | помірна | 5 | |
| 12 | Листкова пластинка: хвилястість краю | слабка | 3 | |
| 13 | Верхівковий листочок: форма пластинки | еліптична | 2 | |
| 14 | Верхівковий листочок: форма основи пластинки | заокруглена | 3 | |
| 15 | Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки | загострена | 1 | |
| 16 | Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони | ознака не визначається | 0 | |
| 17 | Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів | ознака не визначається | 0 | |
| 18 | Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток | ознака не визначається | 0 | |
| 19 | Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні | ознака не визначається | 0 | |
| 20 | Бутон: форма в поздовжньому розрізі | ознака не визначається | 0 | |
| 21 | Квітка: за типом | повна | 3 | |
| 22 | Квітка: кількість пелюсток | середня | 5 | до великої |
| 23 | Квітка: група кольору | червоно-пурпурова | 12 | |
| 24 | Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини | ознака не визначається | 0 | |
| 25 | Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток | ознака не визначається | 0 | |
| 26 | Квітка: діаметр | великий | 7 | |
| 27 | Квітка: форма | зіркоподібна | 3 | |
| 28 | Квітка: профіль верхньої частини | плескато-випуклий | 2 | |
| 29 | Квітка: профіль нижньої частини | плескато-випуклий | 3 | |
| 30 | Квітка: аромат | відсутній або дуже слабкий | 1 | |
| 31 | Чашолисток: розчленування | слабке | 3 | |
| 32 | Пелюстка: послідовне розгортання | наявне | 9 | |
| 33 | Пелюстка: форма | оберненоеліптична | 2 | |
| 34 | Пелюстка: зубчатість | відсутня або дуже слабка | 1 | до слабкої |
| 35 | Пелюстка: завершення країв | сильне | 7 | |
| 36 | Пелюстка: хвилястість | слабка | 3 | |
| 37 | Пелюстка: розмір | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Пелюстка: за довжиною | середня | 5 | до довгої |
| 39 | Пелюстка: за шириною | широка | 7 | |
| 40 | Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі) | один | 1 | |
| 41 | Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі) | рівномірне | 2 | |
| 42 | Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні) | пурпурово-червоне | 23 | |
| 43 | Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі) | ознака не визначається | 0 | |
| 44 | Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі) | ознака не визначається | 0 | |
| 45 | Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці | ознака не визначається | 0 | |
| 46 | Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці | ознака не визначається | 0 | |
| 47 | Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку | наявна | 9 | |
| 48 | Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку | малий | 3 | до середнього |
| 49 | Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку | біле | 1 | |
| 50 | Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку) | ознака не визначається | 0 | |
| 51 | Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки | світло-жовте | 3 | |
| 52 | Плід: розмір (пелюстки обпали) | ознака не визначається | 0 | |
| 53 | Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу | ознака не визначається | 0 | |
| 54 | Плід (гіпантій): забарвлення під час досягання | ознака не визначається | 0 | |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 100,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 1. Діаметр квітки, см – 10,0. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 50. Аромат квітки, бал (1–9) – 1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 5; борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 5; інфекційний опік (*Coniothyrium wernsdorfflac* Lanb.) – 5; чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 5; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 5. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 5; трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 5; оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 5; бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.