

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 20009133 Назва сорту:** Атлантіко **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011**Дата пріоритету:** 18.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.12.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220774****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака   | Проявлення                 | Код | Примітка      |
|------|--|----------------------------|-----|---------------|
| 1    | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви                               | сильне                     | 7   |               |
| 2    | Перший листок: форма верхівки  | округла                    | 3   |               |
| 3    | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                                 | сильна                     | 3   |               |
| 4    | Листок: хвилястість краю пластинки   | помірна                    | 2   |               |
| 5    | Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом                             | середній                   | 5   |               |
| 6    | Листок: положення пластинки у просторі                                     | ледь похиле                | 3   |               |
| 7    | Стебло: зигзагоподібність  | відсутня або дуже слабка   | 1   |               |
| 8    | Волоть: час цвітіння   | від раннього до середнього | 4   |               |
| 9    | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски                    | відсутнє або дуже слабке   | 1   | до слабкого   |
| 10   | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи        | відсутнє або дуже слабке   | 1   | до слабкого   |
| 11   | Волоть: антоціанове забарвлення пилляків                                   | слабке                     | 3   |               |
| 12   | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками                        | середній                   | 5   |               |
| 13   | Волоть: положення бічних гілочок у просторі                                | пряме                      | 1   |               |
| 14   | Волоть: кількість первинних бічних гілочок                                 | відсутні або дуже мала     | 1   |               |
| 15   | Качан: час появи шовку   | середній                   | 5   |               |
| 16   | Качан: антоціанове забарвлення шовку                                       | слабке                     | 3   |               |
| 17   | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів                         | помірне                    | 5   |               |
| 18   | Волоть: розташування колосків за щільністю                                 | нешільне                   | 3   |               |
| 19   | Листок: антоціанове забарвлення піхви                                      | відсутнє або дуже слабке   | 1   |               |
| 20   | Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів                                   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |               |
| 21   | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)  | довга                      | 7   |               |
| 22   | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) | середня                    | 5   |               |
| 23   | Волоть: бічна гілочка за довжиною  | довга                      | 7   |               |
| 24,1 | Лише для інбрідних ліній та сортів з цукровим або розлускним типом зерна.  | ознака<br>не визначається  | 0   |               |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з   | дуже довга                 | 9   |               |
| 25   | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти     | мале                       | 3   | до середнього |
| 26   | Листок: пластинка за ширину  | середня                    | 5   | до широкою    |
| 27   | Качан: ніжка за довжиною   | середня                    | 5   |               |
| 28   | Качан: за довжиною   | середній                   | 5   |               |
| 29   | Качан: діаметр (посередині)  | великий                    | 7   |               |
| 30   | Качан: форма   | конусно-циліндрична        | 2   |               |
| 31   | Качан: кількість зернових рядів  | мала                       | 3   |               |
| 32   | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість   | ознака<br>не визначається  | 0   |               |
| 33   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність         | ознака<br>не визначається  | 0   |               |
| 34   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною           | ознака<br>не визначається  | 0   |               |
| 35   | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за ширину             | ознака<br>не визначається  | 0   |               |
| 36   | Качан: тип зернівки  | кременистоподібний         | 2   |               |
| 37   | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок     | ознака<br>не визначається  | 0   |               |
| 38   | Качан: забарвлення верхівки зернівки                                       | жовто-оранжеве             | 4   |               |
| 39   | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу      | оранжеве                   | 5   |               |
| 40   | Лише для сортів з розлускним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення     | ознака<br>не визначається  | 0   |               |
| 41   | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня                               | відсутнє або дуже слабке   | 1   |               |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |       |       |
|---|----------|-------|-------|
|   | С        | Л     | П     |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,24     | 8,22  | 7,18  |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га  | 7,09     | 8,41  | 8,19  |
| + - до усередненої урожайності, т/га  | 1,85     | 0,19  | 1,01  |
| + - до усередненої урожайності, %   | 35,3     | 2,3   | 12,3  |
| Довірчий інтервал, т/га   | 0,10     | 0,06  | 0,07  |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 113      | 115   | 119   |
| Висота рослини, см  | 254,5    | 279,9 | 266,6 |
| Вихід зерна, %  | 80,1     | 81    | 83,6  |
| Висота прикріплення качана, см  | 89,2     | 95,5  | 94,8  |
| Відсоток рослин з пониклими качанами, %   | 46,7     | 15,5  | 9,4   |
| Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см                                      | 5,6      | 4,9   | 5,2   |
| Вміст білка, %  | 9,5      | 7,9   | 8,9   |
| Вміст крохмалю, %   | 72,1     | 73,4  | 72    |
| Стійкість до посухи, бал  | 7        | 7     | 6     |
| Стійкість до вилягання, бал   | 9        | 8     | 8     |
| Стійкість проти пухирчастої сажки, бал  | 8        | 8     | 9     |
| Стійкість проти стеблової гнилі, бал  | 9        | 9     | 8     |
| Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал   | 7        | 5     | 6     |
| Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал  | 7        | 9     | 7     |
| Група стиглості (ФАО)   | 2        | 2     | 2     |
| Напрям використання   | зерн     | зерн  | зерн  |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**