

**Вид:** Канна індійська *Canna indica* L.

**Заявка № 15324001 Назва сорту:** Любава **Заявник (код):** 2075 **Власник сорту (код):** 2075

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 05.05.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180800**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою на початку цвітіння	середня	5
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
4	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
5	Листкова пластинка: глянуватість	слабка	1
6	Листок: забарвлення жилок	пурпурове	5
7	Листкова пластинка: основне забарвлення	темно-фіолетове	29
8	Листкова пластинка: вторинне забарвлення (за винятком жилок)	відсутнє	1
9	Листкова пластинка: візерунок вторинного забарвлення (за винятком жилок)	ознака не визначається	0
10	Суцвіття: положення відносно до листків	помірно вище	2
11	Суцвіття: за довжиною (за винятком квітконіжки)	середнє	5
12	Суцвіття: розміщення стамінодій	помірно перекриваються	2
13	Стамінодій: за шириною (за винятком першої квітки)	середній	5
14	Стамінодій: викривлення	слабке	1
15	Стамінодій: хвилястість	помірна	2
16	Стамінодій: первинне забарвлення	оранжеве	3
17	Стамінодій: забарвлення рум'янцю	червоне	5
18	Стамінодій: забарвлення полум'яного візерунку	відсутній	1
19	Стамінодій: основне забарвлення плям	плями відсутні	1
20	Стамінодій: забарвлення крайової зони	як основне забарвлення	1
21	Час початку цвітіння	середній	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 150,0. Тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння, дів – 89. Тривалість цвітіння рослини, дів – 79. Декоративність, бал (11–99) – 91. Продуктивність цвітіння (квіток у суцвітті), шт. – 19. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 8. Лежкість кореневищ, % – 79. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): не виявлено. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): не виявлено.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.