

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 18040014 Назва сорту:** Каменяр **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.12.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220995**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	до середнього
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3	до середніх
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3	до середньої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,93	3,34	2,53
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,24	2,69	2,39
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,31	-0,65	-0,14
+, - до усередненої урожайності, %	16,1	-19,5	-4,2
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб	290	300	313
Висота рослини, см	120,5	114,4	138,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	5,2	5,2
Вміст білка, %	20,4	18,8	19,3
Вміст олії, %	45,3	46,9	46,3
Вміст ерукової кислоти, %	1,5	1,5	1,6
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсипання, бал	6	6	6
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	5	8	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	6	6	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	6	7
Блок	4	4	4
Напрямок використання	ТХН	ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.**