

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 18040015 Назва сорту: Каньйон Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220996

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	до середніх
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3	до середньої
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,93	3,34	2,53
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,24	2,75	2,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,31	-0,59	-0,45
+, - до усередненої урожайності, %	16,1	-17,7	-13,5
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб	290	299	313
Висота рослини, см	122,3	122,1	138,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,4	5,7	5,2
Вміст білка, %	21	18,8	19,2
Вміст олії, %	44,7	46,9	46,4
Вміст ерукової кислоти, %	0,6	0,5	0,6
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,7	0,8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	6	6	5
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	5	7	4
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	6	6	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	8	5
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	7	7
Блок	4	4	4
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.