

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare L.***Заявка № 20020005 Назва сорту:** Кряж **Заявник (код):** 2854**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.11.2022 **Патент № 220675****Дата пріоритету:** 28.09.2020**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: габітус (форма куща) | напіврозлогий | 5 | |
| 2 | Нижні листки: опушення піхви | відсутнє | 1 | |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | наявне | 9 | |
| 4 | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок | помірна | 5 | |
| 5 | Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком | середня | 5 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | помірний | 5 | |
| 7 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | ранній | 3 | |
| 8 | Остюки: антоціанове забарвлення кінчики | наявне | 9 | |
| 9 | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчики | слабка | 3 | |
| 10 | Колос: восковий наліт | помірний | 5 | |
| 11 | Колос: положення у просторі | напівпоникле | 7 | |
| 12 | Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки) | коротка | 3 | |
| 13 | Колос: кількість рядів | два | 1 | |
| 14 | Колос: форма | піраміdalna | 3 | |
| 15 | Колос: за щільністю | дуже нещільний | 1 | |
| 16 | Колос: за довжиною (з остюками) | довгий | 3 | |
| 17 | Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) | довгі | 7 | |
| 18 | Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту | короткий | 3 | |
| 19 | Стрижень колосу: вигин першого сегмента | малий | 3 | |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) | від паралельного до ледь відхиленого | 2 | |
| 21 | Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки | коротші | 1 | |
| 22 | Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною | довгі | 2 | |
| 23 | Зернівка: плівчастість | наявна | 9 | |
| 24 | Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски | відсутнія або дуже слабка | 1 | |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски | слабке | 3 | |
| 26 | Зернівка: опушення центральної борідки | відсутнє | 1 | |
| 27 | Зернівка: розташування лодицул | фронтальне | 1 | |
| 28 | Зернівка: забарвлення алейронового шару | слабке забарвлення | 2 | |
| 29 | Тип розвитку | ярий | 3 | |
| 30 | Колос: остюки | наявні | 9 | |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення | остюки | 5 | |
| 32 | Зернівка: форма | еліптична | 3 | |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски | грубозморшкувата | 9 | |
| 34 | Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски | наявне | 9 | |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка | поступовий | 2 | |
| 36 | Вушка: форма верхівки | шилоподібна | 3 | |
| 37 | Вушка: охоплення соломини | перекриваюче | 3 | |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення | сильний | 7 | |
| 39 | Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом) | слабко виповнена | 3 | |
| 40 | Рослина: утворення пінки (чоловіча стерильність) | наявне | 9 | |
| 41 | Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 42 | Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів) | розвинутий | 2 | |
| 43 | Квіткова луска: форма основи | не скосена | 1 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 3,25 | 4,98 | 3,91 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 3,64 | 4,43 | 4,31 |
| + - до усередненої урожайності, т/га | 0,39 | -0,55 | 0,40 |
| + - до усередненої урожайності, % | 12,0 | -11,0 | 8,0 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,11 | 0,11 | 0,07 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 84 | 76 | 75 |
| Висота рослини, см | 77,5 | 62,8 | 77,2 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | 43,5 | 51,3 | 44,7 |
| Вміст білка, % | 12,9 | 14,2 | 14,2 |
| Виривність зерна, % | 94,5 | 97,8 | 96,5 |
| Стійкість до вилягання, бал | 3 | 7 | 5 |
| Стійкість до обсипання, бал | 9 | 9 | 7 |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 7 | 7 |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал | 6 | 9 | 7 |
| Стійкість проти бурої тржі, бал | 8 | 7 | 7 |
| Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал | 6 | 8 | 5 |
| Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал | 9 | 9 | 9 |
| Блок | 1 | 1 | 1 |
| Напрям використання | зерн | зерн | зерн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.