

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045029 Назва сорту: 50БЗАХ02 01 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220740

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час достигання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,58	3,44	3,24
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,72	0,33	0,36
+, - до усередненої урожайності, %	38,7	10,6	11,6
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	115	121	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	186,6	213	193,8
Висота рослини, см	58,2	86,3	82
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,3	12	14,3
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	38	41	38,1
Вміст олії, %	23,1	21,1	22,4
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.