

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 13040002 Назва сорту: ФАКТОР КВС Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171388

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з частковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,9	36,8	24,4
± до усередненої урожайності, ц/га	0,6	6,2	-2
± до усередненої урожайності, %	3	20	-8
Стійкість до вилягання, бал	9	8,2	9
Стійкість до посухи, бал	8	8,6	8,7
Стійкість до осипання, бал	8	7,4	7,3
Зимостійкість, бал	6,5	9	8
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	7,5	8,6	7,7
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7	8,6	6,3
Стійкість до бактеріозу, бал	8,5	8,6	7,3
Стійкість до пероноспорозу, бал	7,5	8,6	6,7
Вміст білка, %	24	22,9	20,4
Вміст олії, %	45,8	46,6	47,4
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.