

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045015 Назва сорту: Гуцулка **Заявник (код):** 1807 **Власник сорту (код):** 1807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.12.2022 **Патент № 220956**

Дата пріоритету: 05.10.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220817

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (триїчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричнєве	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,77	3,06	2,92
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,98	3,25	2,75
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,21	0,19	-0,17
+, - до усередненої урожайності, %	11,9	6,2	-5,6
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,10	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	107	115	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	172,2	200,7	186,8
Висота рослини, см	66,2	96,8	87,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14	11,8	15,4
Стійкість до вилягання, бал	8	5	4
Стійкість до обсіпання, бал	6	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	38,8	39,9	36,7
Вміст олії, %	23	22	23,1
Блок (Група стиглості)	6	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.