

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045059 Назва сорту: Дакота **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

Дата пріоритету: 28.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220824

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	сильна	7	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	майже чорне	5	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінневої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,28	3,97	3,46
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,42	0,86	0,58
+, - до усередненої урожайності, %	76,3	27,7	18,6
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	124	124	133
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	175	203,6	171,1
Висота рослини, см	71,2	97,3	92,7
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,9	15,7	17,4
Стійкість до вилягання, бал	8	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	38	39,3	36,5
Вміст олії, %	23,3	21,6	22,9
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.