

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045019 Назва сорту: Ері **Заявник (код):** 2739 **Власник сорту (код):** 2739

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220974

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,77	3,06	2,92
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,66	3,18	3,09
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	0,12	0,17
+, - до усередненої урожайності, %	50,3	3,9	5,8
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,10	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	99	107	106
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	189,8	226,3	213,2
Висота рослини, см	57	82,8	80,2
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,4	11	17,4
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	39,1	41,5	37,6
Вміст олії, %	22,6	21,1	22,7
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.