

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045022 Назва сорту: Калгарі **Заявник (код):** 2739 **Власник сорту (код):** 2739

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220977

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,77	3,06	2,92
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,51	3,37	3,32
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	0,31	0,40
+, - до усередненої урожайності, %	41,8	10,1	13,1
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,10	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	108	124	123
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	184,1	226,6	193,6
Висота рослини, см	55,1	92,7	79,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,8	12	14,7
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	39,6	41,2	38,6
Вміст олії, %	22,1	20,7	22,1
Блок (Група стиглості)	6	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.