

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045020 Назва сорту: Кіркланд **Заявник (код):** 2739 **Власник сорту (код):** 2739

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220975

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (триїчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,77	3,33	2,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,91	0,22	-0,02
+, - до усередненої урожайності, %	48,9	7,1	-0,6
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	122	132	135
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	177,5	217,8	195,8
Висота рослини, см	74	94,8	90,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,9	13,5	16,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	38,3	41	37,2
Вміст олії, %	23,1	20,4	21,3
Блок (Група стиглості)	7	8	8
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.