

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045055 Назва сорту: Ліска **Заявник (код):** 142 **Власник сорту (код):** 142

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.12.2022 **Патент № 220847**

Дата пріоритету: 24.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220822

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,80	3,52	3,16
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,94	0,41	0,28
+, - до усередненої урожайності, %	50,5	13,2	9,0
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	116	117	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	164,1	217	184,8
Висота рослини, см	60,7	80,2	81,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	13,3	14
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	41,2	44,6	39,7
Вміст олії, %	21,2	19,4	21,1
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	сл	сл	сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.