

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill  
**Заявка № 20045048 Назва сорту:** Містік **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061  
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.12.2022 **Патент № 220845**  
**Дата пріоритету:** 14.12.2020  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.12.2022  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220819**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насінневі оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,64	3,17	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,82	3,47	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,18	0,30	
+, - до усередненої урожайності, %	72,0	9,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,37	0,33	
Тривалість періоду вегетації, діб	130	133	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	161,8	204,8	
Висота рослини, см	63,4	86,8	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12	10,8	
Стійкість до вилягання, бал	9	6	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	37,4	40,1	
Вміст олії, %	24,2	21,6	
Блок (Група стиглості)	8	8	
Напрямок використання	сбіл	сбіл	
Якість	вл	сл	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.