

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 20045021 Назва сорту:** Нунавік **Заявник (код):** 2739 **Власник сорту (код):** 2739

**Дата пріоритету:** 02.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.12.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220976**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,77	3,06	2,92
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,35	3,44	2,91
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,38	-0,01
+, - до усередненої урожайності, %	32,8	12,4	-0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,10	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	99	112	108
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	186,3	218,2	203,2
Висота рослини, см	50,5	73,8	67,2
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,7	10,3	13,6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	40	43,6	39,3
Вміст олії, %	21,8	19,7	21,4
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напряма використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	сл	сл	сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.