

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill**Заявка №** 20045053 **Назва сорту:** Сасекс **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.12.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 220980**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушенні головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінінна: розмір	середній	5	
14	Насінінна: форма	видовжено-плескаті	4	
15	Насінінна: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінінна: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінінна: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінінна: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягнення	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,77	3,06	2,92
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,49	3,79	3,31
+ - до усередненої урожайності, т/га	0,72	0,73	0,39
+ - до усередненої урожайності, %	40,7	23,9	12,7
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,10	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	103	111	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	151,7	189,9	169,7
Висота рослини, см	55,3	89	80,7
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11	13,5	14,9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	7
Вміст білка, %	38	40,4	37,4
Вміст олії, %	23,3	21,9	22,9
Блок (Група стиглості)	6	6	7
Напрям використання	сбл	сбл	сбл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.