

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill  
**Заявка № 21045006 Назва сорту:** CBX2003 **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061  
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.12.2022 **Патент № 220848**  
**Дата пріоритету:** 16.02.2021  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.12.2022  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220827**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насінневій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,59	3,46	3,42
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,73	0,35	0,54
+, - до усередненої урожайності, %	39,2	11,3	17,4
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	114	121	127
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	162,1	182,9	167,1
Висота рослини, см	63,6	87	88,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,2	11,3	14,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	7	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	7	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	8
Вміст білка, %	37,9	39,3	36
Вміст олії, %	23,2	21,3	22,3
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.