

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 20045049 Назва сорту:** CBX20T0C11 **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 16.12.2022 **Патент № 220846**

**Дата пріоритету:** 14.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.12.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220820**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	сильна	7	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,17	3,78	3,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,31	0,67	0,35
+, - до усередненої урожайності, %	70,4	21,5	11,3
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	122	129	138
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	173,1	194,5	173,3
Висота рослини, см	64,3	87,7	95,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,6	14,2	15
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	37,5	38,7	35,4
Вміст олії, %	23,4	21,3	22,3
Блок (група стиглості)	7	7	8
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.