

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 21045007 Назва сорту: СТИНЕ 11Н20 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

Дата пріоритету: 11.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220828

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	стре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,12	3,66	3,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,26	0,55	0,53
+, - до усередненої урожайності, %	67,7	17,7	17,0
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	119	130	136
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	172,8	204,5	166,9
Висота рослини, см	54	72,5	74,2
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,3	10,2	15,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	34,6	37,3	33,9
Вміст олії, %	23,9	20,8	22,5
Блок (Група стиглості)	7	7	8
Напрямок використання	нбіл	сбіл	нбіл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.