

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 21045002 Назва сорту: Уруз Заявник (код): 2430 Власник сорту (код): 2430

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2022 Патент № 220893

Дата пріоритету: 11.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220981

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,77	3,06	2,92
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,03	2,65	2,60
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,26	-0,41	-0,32
+, - до усередненої урожайності, %	14,7	-13,4	-10,5
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,10	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	102	108	116
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	166,2	219,8	185,5
Висота рослини, см	59,1	84,3	72,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,2	13,8	13,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	6	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	5
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	37	39,3	36,1
Вміст олії, %	21,9	20,4	21,2
Блок (Група стиглості)	6	6	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	сл	сл	сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.