

Вид: Просо посівне *Panicum miliaceum* L.

Заявка № 20014001 Назва сорту: Кеша Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626

Дата пріоритету: 09.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220991

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Прапорцевий листок: положення листкової пластинки	напівпряме	3	
2	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
6	Стебло: кількість вузлів	середня	5	
7	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною	коротке	3	
8	Стебло: міжвузля за товщиною	товсте	7	
9	Час виявлення волоті	середній	5	
10	Рослина: за висотою (стебло та волоть)	висока	7	
11	Волоть: кут відхилення гілочок	помірно гострий	2	
12	Волоть: положення у просторі	помірно похиле	3	
13	Волоть: головна вісь за довжиною (без квітконіжки)	довга	7	
14	Волоть: за шириною	середня	5	
15	Волоть: за щільністю	середня	5	
16	Волоть: ступінь вигину бічних гілочок	середній	5	
17	Волоть: кількість подушечок	дуже велика	9	
18	Волоть: гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
19	Колосок: форма	широкоеліптична	2	
20	Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення	слабка	3	
21	Колоскова луска: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Приймочка маточки: забарвлення	світло-рожеве	1	
23	Зернівка: розмір	середній	5	
24	Зернівка: форма	округла	3	
25	Зернівка: забарвлення	коричневе	11	
26	Зернівка: плямистість	відсутня	1	
27	Зернівка: розмір плям	малий	3	
28	Маса 1000 зерен	велика	7	
29	Ядро (не шліфоване): забарвлення	жовте	3	
30	Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення насінневого рубчика	слабка	1	
31	Ядро: тип ендосперму	восковий	1	
32	Стійкість проти ураження расами сажки ( <i>Sporisorium destruens</i> Yank)	ознака не визначалась	0	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,73	2,92	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,36	3,60	3,10
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,63	0,68	0,62
+, - до усередненої урожайності, %	23,1	23,3	21,2
Довірчий інтервал, т/га	0,37	0,29	0,26
Тривалість періоду вегетації, діб	81	104	94
Висота рослини, см	105,5	127,5	127
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	8,4	8,2	8,4
Вимолочуваність, бал	9	7,6	8
Вміст білка, %	15,3	13,3	11,6
Плівковість зерна, %	17,9	18,8	19
Вихід крупи, %	77,7	77,4	76,8
Стійкість до вилягання, бал	6	6	8
Стійкість до обсіпання, бал	6	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал	9	6	8
Стійкість проти сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти просяного комарика, бал	9	7	7
Напрямок використання	х	х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.