

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009201 Назва сорту: СИ ГРАНАПІС Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220878

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|---|----------------------------|-----|---------------|
| 1 | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви | сильне | 7 | |
| 2 | Перший листок: форма верхівки | округла | 3 | |
| 3 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 2 | |
| 4 | Листок: хвилястість краю пластиинки | помірна | 2 | |
| 5 | Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом | малий | 3 | |
| 6 | Листок: положення пластиинки у просторі | ледь похиле | 3 | |
| 7 | Стебло: зигзагоподібність | слабка | 2 | |
| 8 | Волоть: час цвітіння | від раннього до середнього | 4 | |
| 9 | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски | слабке | 3 | |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи | слабке | 3 | до помірного |
| 11 | Волоть: антоціанове забарвлення піляків | помірне | 5 | |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками | середній | 5 | |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочек у просторі | пряме | 1 | |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочек | відсутні або дуже мала | 1 | до малої |
| 15 | Качан: час появи шовку | середній | 5 | |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення шовку | слабке | 3 | |
| 17 | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів | помірне | 5 | |
| 18 | Волоть: розташування колосків за щільністю | середньої щільності | 5 | |
| 19 | Листок: антоціанове забарвлення піхви | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 20 | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів | слабке | 3 | |
| 21 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) | середня | 5 | |
| 22 | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) | коротка | 3 | |
| 23 | Волоть: бічна гілочка за довжиною | середня | 5 | |
| 24,1 | Лише для інbredних ліній та сортів з цукровим або розлускним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною | довга | 7 | |
| 25 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини | мале | 3 | до середнього |
| 26 | Листок: пластиинка за ширину | середня | 5 | |
| 27 | Качан: ніжка за довжиною | коротка | 3 | |
| 28 | Качан: за довжиною | середній | 5 | |
| 29 | Качан: діаметр (посередині) | великий | 7 | |
| 30 | Качан: форма | конусно-циліндрична | 2 | |
| 31 | Качан: кількість зернових рядів | середня | 5 | |
| 32 | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен | ознака не визначається | 0 | |
| 33 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору | ознака не визначається | 0 | |
| 34 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 35 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за ширину | ознака не визначається | 0 | |
| 36 | Качан: тип зернівки | зубовидний | 5 | |
| 37 | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Качан: забарвлення верхівки зернівки | жовте | 3 | |
| 39 | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок | жовто-оранжеве | 4 | |
| 40 | Лише для сортів з розлускним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення | ознака не визначається | 0 | |
| 41 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | сильне | 7 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,64 | 8,78 | 8,00 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 8,95 | 8,61 | 7,96 |
| + - до усередненої урожайності, т/га | 3,31 | -0,17 | -0,04 |
| + - до усередненої урожайності, % | 58,7 | -1,9 | -0,5 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,12 | 0,08 | 0,11 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 124 | 126 | 127 |
| Висота рослини, см | 238,6 | 247,6 | 237,4 |
| Вихід зерна, % | 86,8 | 81,2 | 81,1 |
| Висота прикріплення качана, см | 99,3 | 94,1 | 90,9 |
| Відсоток рослин з пониклими качанами, % | 46,5 | 18,6 | 16,5 |
| Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см | 6,7 | 4,2 | 4,5 |
| Вміст білка, % | 9 | 7,4 | 8,2 |
| Вміст крохмалю, % | 72,5 | 74,1 | 73,1 |
| Стійкість до посухи, бал | 5 | 9 | 7 |
| Стійкість до вилягання, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість проти пухирчастої сажки, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість проти стеблової гнилі, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал | 4 | 5 | 7 |
| Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал | 6 | 9 | 8 |
| Група стиглості (ФАО) | 3 | 3 | 3 |
| Напрям використання | зерн | зерн | зерн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.