

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 20155001 Назва сорту: АРІМАЦІ **Заявник (код):** 2669 **Власник сорту (код):** 2669

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.11.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220646

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Плоїдність	ознака не визначалась	0	
3	Сім'ядолі: за довжиною	ознака не визначалась	0	
4	Сім'ядолі: за шириною	ознака не визначалась	0	
5	Рослина: за висотою у рік сівби	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	напівпрямий	3	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	низька	3	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
12	Стебло: за довжиною	довге	7	
13	Стебло: за товщиною	товсте	7	
14	Стебло: кількість міжвузлів	велика	7	
15	Стебло: щільність опушення	помірна	5	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	довгий	7	
18	Листок: центральний листочок за шириною	широкий	7	
19	Листок: частота наявності білих міток	висока	7	
20	Рослина: за природною висотою другого укусу	низька	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,62	5,38
Урожайність сухої речовини, т/га		7,13	7,59
+ , - до усередненої урожайності, т/га		0,51	2,21
+ , - до усередненої урожайності, %		7,7	33,4
Довірчий інтервал, т/га		2,10	2,92
Тривалість періоду вегетації, днів		150	102
Залистяність, %		51,7	41,4
Вміст білка (сирого протеїну), %		22,4	18,7
Стійкість до вилягання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		6	6
Стійкість проти антракнозу, бал		7	8
Стійкість проти стеблової іржі, бал		7	8
Стійкість проти бурої плямистості, бал		7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	8
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал		8	8
Зимостійкість, бал		7	6
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га		1,9	1,6
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.