

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 20196005 Назва сорту: СВ3211 **Заявник (код):** 2673 **Власник сорту (код):** 2673

Дата пріоритету: 05.02.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 221062

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напіврозлогий	7	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сіви (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сіви)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	низька	3	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сіви (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сіви (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 9	9	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,71	9,48	10,07
Урожайність сухої речовини, т/га	6,73	14,03	13,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,02	4,55	3,61
+, - до усередненої урожайності, %	17,9	48,0	38,1
Довірчий інтервал, т/га	0,67	1,54	1,42
Тривалість періоду вегетації, діб	83	163	103
Залистяність, %	48,1	64,1	44,8
Вміст білка (сирого протеїну), %	17,1	22,6	20
Стійкість до вилягання, бал	7	6	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти іржі, бал	8	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	8
Стійкість проти бурої плямистості, бал	9	9	8
Зимостійкість, бал	9	8	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га	2,1	2,1	2,2
Блок	1	1	1
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.