

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 20106007 Назва сорту: Боніта Заявник (код): 1725 Власник сорту (код): 1725

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.11.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220685

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|--|-----------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: кількість листків на псевдостеблі | середня | 5 | |
| 2 | Листки: положення | від прямого до напівпрямого | 2 | |
| 3 | Листки: восковий наліт | помірний | 5 | |
| 4 | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 5 | Листки: зігнутість | відсутня або слабка | 1 | |
| 6,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною | довгий | 7 | |
| 6,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 7,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр | середній | 5 | |
| 7,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр | ознака не визначається | 0 | |
| 8 | Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка) | середнє | 5 | |
| 9 | Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини) | середній | 5 | |
| 10 | Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 11 | Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутній або дуже слабкий | 1 | |
| 12,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір | великий | 7 | |
| 12,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір | ознака не визначається | 0 | |
| 13,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою | висока | 7 | |
| 13,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою | ознака не визначається | 0 | |
| 14,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр | великий | 7 | |
| 14,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр | ознака не визначається | 0 | |
| 15,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр | середнє | 5 | |
| 15,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр | ознака не визначається | 0 | |
| 16 | Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра | посередині | 2 | |
| 17 | Цибулина/цибулинка: шийка за шириною | вузька | 3 | |
| 18 | Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу) | округла | 4 | |
| 19 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18) | округла | 4 | |
| 20 | Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18) | округла | 3 | |
| 21 | Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання | помірна | 5 | |
| 22 | Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною | середня | 5 | |
| 23 | Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки | коричневе | 5 | |
| 24 | За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки | помірна | 5 | |
| 25 | Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення) | коричнюватий | 5 | |
| 26 | Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок | зеленувате | 2 | |
| 27 | Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг | мала | 3 | |
| 28 | Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини | низький | 3 | |
| 29 | Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 30 | Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби | ознака не визначається | 0 | |
| 31 | Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени | помірна | 5 | |
| 32 | Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени | середній | 5 | |
| 33 | Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин) | середній | 5 | |
| 34,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) | середній | 5 | |
| 34,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) | ознака не визначається | 0 | |
| 35 | Час проростання за зберігання цибулин | середній | 5 | |
| 36 | Чоловіча стерильність | низька | 2 | |

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 81,0. Товарна врожайність, т/га – 81,0. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 350,0. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 7,2; сухої речовини, % – 9,4; загального цукру % – 6,5. Лежкість, діб – 200. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 8; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.