

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 20106013 Назва сорту: Онеїда Заявник (код): 751 2758 Власник сорту (код): 751 2758

Дата пріоритету: 23.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220984

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака  | Проявлення                 | Код | Примітка |
|------|---|----------------------------|-----|----------|
| 1    | Рослина: кількість листків на псевдостеблі  | велика                     | 7   |          |
| 2    | Листки: положення   | пряме                      | 1   |          |
| 3    | Листки: восковий наліт  | сильний                    | 7   |          |
| 4    | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення  | сильна                     | 7   |          |
| 5    | Листки: зігнутість  | відсутня або слабка        | 1   |          |
| 6,1  | Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною  | довгий                     | 7   |          |
| 6,2  | Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 7,1  | Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр  | середній                   | 5   |          |
| 7,2  | Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 8    | Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)   | середнє                    | 5   |          |
| 9    | Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)   | середній                   | 5   |          |
| 10   | Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутня або дуже слабка   | 1   |          |
| 11   | Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)  | відсутній або дуже слабкий | 1   |          |
| 12,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір   | великий                    | 7   |          |
| 12,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 13,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою   | висока                     | 7   |          |
| 13,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 14,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр  | великий                    | 7   |          |
| 14,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 15,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр  | середнє                    | 5   |          |
| 15,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 16   | Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра  | посередині                 | 2   |          |
| 17   | Цибулина/цибулинка: шийка за шириною  | вузька                     | 3   |          |
| 18   | Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)  | округла                    | 4   |          |
| 19   | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)   | округла                    | 4   |          |
| 20   | Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)  | округла                    | 3   |          |
| 21   | Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання   | помірна                    | 5   |          |
| 22   | Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною   | середня                    | 5   |          |
| 23   | Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки  | коричневе                  | 5   |          |
| 24   | За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки                   | сильна                     | 7   |          |
| 25   | Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)                                       | коричнюватий               | 5   |          |
| 26   | Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок   | зеленувате                 | 2   |          |
| 27   | Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг   | мала                       | 3   |          |
| 28   | Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини  | низький                    | 3   |          |
| 29   | Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби  | відсутня або дуже слабка   | 1   |          |
| 30   | Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 31   | Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени  | сильна                     | 7   |          |
| 32   | Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени   | ранній                     | 3   |          |
| 33   | Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)                              | ранній                     | 3   |          |
| 34,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)   | середній                   | 5   |          |
| 34,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 35   | Час проростання за зберігання цибулин   | середній                   | 5   |          |
| 36   | Чоловіча стерильність   | низька                     | 2   |          |

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 110,0. Товарна врожайність, т/га – 90,0. Тривалість вегетації рослин, днів – 120. Маса цибулини, г – 130,0. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 6,8; сухої речовини, % – 6,0; загального цукру % – 4,1. Лежкість, днів – 110. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 8; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**