

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 22297001 Назва сорту: Єдність **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата пріоритету: 02.09.2022

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 221068

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	велика	7	
4	Однорічний пагін: забарвлення	сірувате	4	
5	Вегетативна брунька: положення відносно пагона	помірно відхилене	2	
6	Вегетативна брунька: за довжиною	середня	5	
7	Вегетативна брунька: форма верхівки	вужькозагострена	1	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
9	Вегетативна брунька: наліт	помірний	5	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: основа	закрита	4	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	сильна	7	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	помірна	2	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	слабке	3	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівці	одне або два	1	
19	Суцвіття: за довжиною	середнє	2	
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	слабке	3	
23	Суцвіття: тип	гроно	2	
24	Суцвіття: коливання у розмірах ягід	мале	1	
25	Плід: розмір	великий	7	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
27	Плід: глянуватість	помірна	5	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	ранній	3	
29	Час початку цвітіння	ранній	3	
30	Час початку збирання плодів	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 13,1. Середній урожай з куща, кг – 2,9. Середня маса ягоди, г – 1,3. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 149,0; загального цукру, % – 9,3; пектинових речовин, % – 0,6; сухих розчинних речовин, % – 19,5. Загальна кислотність, % – 3,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 7; борошниста роса – 9; іржа – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий – 7; попелиця – 6; склівка – 6. Підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Зимостійкість, балів (1–9) – 9. Стійкість до посухи, балів (1–9) – 8. Група стиглості – рс. Напрямок використання – ун. Схема садіння, м – 3 x 0,75. Дегустаційна оцінка, балів (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.