

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 22297002 Назва сорту: Мережка **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата пріоритету: 02.09.2022

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 221069

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	висока	7	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
4	Однорічний пагін: забарвлення	коричневе	3	
5	Вегетативна брунька: положення відносно пагона	сильно відхилене	3	
6	Вегетативна брунька: за довжиною	довга	7	
7	Вегетативна брунька: форма верхівки	вужькозагострена	1	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
9	Вегетативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: основа	помірно відкрита	2	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	середня	5	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	сильна	3	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	слабке	3	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівці	одне або два	1	
19	Суцвіття: за довжиною	середнє	2	
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	слабке	3	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	слабке	3	
23	Суцвіття: тип	гроно	2	
24	Суцвіття: коливання у розмірах ягід	середнє	2	
25	Плід: розмір	великий	7	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
27	Плід: глянуватість	помірна	5	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	середній	5	
29	Час початку цвітіння	середній	5	
30	Час початку збирання плодів	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 15,1. Середній урожай з куща, кг – 3,4. Середня маса ягоди, г – 1,2. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 131,0; загального цукру, % – 9,1; пектинових речовин, % – 1,24; сухих розчинних речовин, % – 16,2. Загальна кислотність, % – 2,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 7; біла плямистість – 8; борошниста роса – 9; іржа – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий – 8; попелиця – 8; склівка – 7. Підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Зимостійкість, балів (1–9) – 9. Стійкість до посухи, балів (1–9) – 7. Група стиглості – пс. Напрямок використання – ун. Схема садіння, м – 3 x 0,75. Дегустаційна оцінка, балів (1–9) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.