

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 22304001 Назва сорту: Смакотуня **Заявник (код):** 2714 **Власник сорту (код):** 2714

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.12.2022 **Патент № 220894**

Дата пріоритету: 07.07.2022

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.12.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220839

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	середній	5	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	нещільна	3	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	світло-мідно-червоне	4	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	середня	5	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	середня	5	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	вертикальне	1	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	середні	5	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	слабка	3	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напіввідкрите	3	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	низька	3	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	середня	5	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	ранній	3	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	великий	7	
33	Гроно: за щільністю	щільне	7	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	коротка	3	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	куляста	2	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорне	9	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	важке	1	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	помірно тверда	2	
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	жовтувато-коричневе	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 18,7. Середній урожай з куща, кг – 17,2. Середня маса 100 ягід, г – 630,0. Середня маса грона, г – 720,0. Горошіння ягід, % – 1. Розтріскування ягід, % – 1. Лежкість при зберіганні, дів – 30. Вихід соку, % – 57,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 1,1; кислот у ягодах, г/л – 3,8. Цукристість соку ягід, % – 17,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 7; мілдью – 7; оїдіум – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 7; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, дів – 120. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 1. Група стиглості – рс. Напрямок використання – стл. Схема садіння, м – 3 x 3. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.