

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.**Заявка № 21122001 Назва сорту:** Король **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781**Дата пріоритету:** 18.01.2021**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.01.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230179****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	одноросткове	1	
2	Паросток: червоне забарвлення гілокотиля	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3	
4	Листок: положення пластиинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3	
6	Листкова пластиинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластиинка: за шириною	вузька	3	
8	Листкова пластиинка: форма	широкоеліптична	7	
9	Листкова пластиинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластиинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластиинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5	
12	Листкова пластиинка: хвильистість краю	помірна	5	
13	Листкова пластиинка: пухирчастість	слабка	3	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5	
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	округла	3	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширіна	мале	1	
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	червоне	3	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або слабка	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність коренеплодів, т/га: загальна – 55,7; товарна – 33,8. Середня маса товарного коренеплоду, г – 300. Тривалість періоду, діб: від повних сходів до пучкової стигlostі коренеплодів – 60; від повних сходів до товарної (технічної) стигlostі коренеплодів – 110; від повних сходів висадків до повного досягнення насіння – 105. Прояв кілець: 9 – наявні. Вміст у коренеплодах: сухої речовини, % – 14,2; загального цукру, % – 12,92; вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8,88; бетаніну, мг/100 г с.р. – 296. Маса 1000 насінин, г – 16.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.