

Вид: Еспарцет виколістий *Onobrychis viciifolia* Scop.

Заявка № 12050001 Назва сорту: Андрео Заявник (код): 1306 Власник сорту (код): 1306

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.11.2017 Патент № 170762

Дата пріоритету: 27.08.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.06.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171082

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: тип розвитку	ярий	2
2	Рослина 1-го року життя: габітус (на початку бутонізації)	напівпрямий	3
3	Рослина 2-го року життя: габітус (на початку бутонізації)	проміжний	5
4	Рослина: за висотою травостою	середня	5
5	Рослина: галуження	помірне	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: опушення в середній частині	наявне	9
8	Стебло: за довжиною	середнє	5
9	Стебло: за товщиною	середнє	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листок: сіро-зелене забарвлення	наявне	9
12	Листок: за довжиною	середній	5
13	Листок: за шириною	середній	5
14	Листочок: за формою	еліптичний	1
15	Рослина 1-го року життя: схильність до цвітіння	висока	7
16	Рослина 2-го року життя: схильність до цвітіння	дуже висока	9
17	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3
18	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
19	Суцвіття: форма	циліндрична	2
20	Квітка: забарвлення	рожеве	2
21	Квітка: рівномірність забарвлення	нерівномірне	1
22	Біб: розмір	середній	5
23	Біб: зубчики	наявні	9
24	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: розміщення зубчиків	поодиночке	1
25	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: зубчики за довжиною	середні	5
26	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: форма зубчиків	тупа	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	54,2	81,3	
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	12,3		
%	29		
Вегетаційний період, днів	52	64	
Стійкість до: бал			
Виліягання	9,0	9,0	
Посухи	9,0	8,0	
Стеблової іржі	8,0	9,0	
Аскохітозу (боби і насіння)	8,0	9,0	
Перезимувало рослин, бал	7,3	9,0	
Залистаність, %	49,5	54,4	
Вміст сирого протеїну, %	18,0	17,8	
Напрямок використання	кормовий	кормовий	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.