

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 19025001 Назва сорту: Горлиця **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.01.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230183

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|---------------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля | відсутнє | 1 | |
| 2 | Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля | ознака не визначається | 0 | |
| 3 | Рослина: тип росту | кущовий | 1 | |
| 4 | Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка | ознака не визначається | 0 | |
| 5 | Лише кущові сорти. Рослина: тип | сланкий | 2 | |
| 6 | Лише кущові сорти. Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 7 | Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин) | ознака не визначається | 0 | |
| 8 | Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання | ознака не визначається | 0 | |
| 9 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 10 | Листок: зморшкуватість | слабка | 3 | |
| 11 | Верхівковий листочок: розмір | великий | 7 | |
| 12 | Верхівковий листочок: форма | округла | 3 | |
| 13 | Верхівковий листочок: верхівка за довжиною | коротка | 1 | |
| 14 | Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння) | проміжне | 2 | |
| 15 | Квітка: розмір приквітків | малий | 3 | |
| 16 | Квітка: забарвлення паруса | рожеве | 3 | |
| 17 | Квітка: забарвлення крил | рожеве | 3 | |
| 18 | Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика) | середній | 5 | |
| 19 | Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18) | ознака не визначається | 0 | |
| 20 | Біб: за шириною | широкий | 7 | |
| 21 | Біб: за товщиною | помірний | 5 | |
| 22 | Біб: форма поперечного перерізу (через насінину) | еліптична | 1 | |
| 23 | Біб: відношення товщини до ширини | мале | 3 | |
| 24 | Біб: основне забарвлення | жовте | 1 | |
| 25 | Біб: інтенсивність основного забарвлення | слабка | 3 | |
| 26 | Біб: вторинне забарвлення | наявне | 9 | |
| 27 | Біб: вторинне забарвлення | рожеве | 1 | |
| 28 | Біб: щільність плям вторинного забарвлення | нещільна | 3 | |
| 29 | Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва | наявна | 9 | |
| 30 | Біб: ступінь вигину | помірний | 5 | |
| 31 | Біб: форма вигину | увігнута | 1 | |
| 32 | Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика) | від загостреної до заокругленої | 2 | |
| 33 | Біб: дзьобик за довжиною | середній | 5 | |
| 34 | Біб: вигин дзьобика | середній | 5 | |
| 35 | Біб: текстура поверхні | гладенька або слабко шерехата | 3 | |
| 36 | Біб: звуження (в сухому стані) | помірне | 2 | |
| 37 | Насіння: маса | середня | 5 | |
| 38 | Насінина: форма поздовжнього розрізу | ниркоподібна | 4 | |
| 39 | Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину | слабкий | 3 | |
| 40 | Насінина: форма поперечного перерізу | еліптична | 3 | |
| 41 | Насінина: за шириною в поперечному перерізі | середня | 5 | |
| 42 | Насінина: за довжиною | коротка | 3 | |
| 43 | Насінина: кількість кольорів | один | 1 | |
| 44 | Насінина: основне забарвлення (найбільша зона) | бежеве | 5 | |
| 45 | Насінина: вторинне забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 46 | Насінина: розподіл вторинного забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 47 | Насінина: вираження орнаменту | сильне | 7 | |
| 48 | Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку) | середній | 5 | |
| 49 | Стійкість проти антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) | ознака не визначалась | 0 | |
| 50 | Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV) | наявна з симптомами | 2 | |
| 51 | Стійкість проти кугастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>) | ознака не визначалась | 0 | |
| 52 | Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>) | ознака не визначалась | 0 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,35. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 17. Тривалість періоду вегетації, днів – 88. Кількість бобів на рослині, шт. – 28. Вміст білка, % – 27. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 7. Дружність досягання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 198. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 7; аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.