

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045051 Назва сорту: ГМАХ 8132 **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

Дата пріоритету: 18.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.02.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230259

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного напівпрямий	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	рудувато-коричневе	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	від низької до середньої	4	
6	Рослина: за висотою	помірна	5	
7	Листок: пухирчастість	загостренояцеподібна	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	середній	5	
9	Листок: розмір бічного листочка	слабка	3	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	фіолетове	2	
11	Квітка: забарвлення	помірна	5	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	середній	5	
13	Насінина: розмір	кулясто-плеската	2	
14	Насінина: форма	жовто-зелене	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	ознака не визначена	0	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	чорне	6	
17	Насінина: забарвлення рубчика	інше	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	середній	5	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,77	3,06	2,92
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,44	2,91	2,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,67	-0,15	-0,24
+, - до усередненої урожайності, %	37,9	-4,9	-8,2
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,10	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	108	119	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	157,3	197,1	157,8
Висота рослини, см	62	90,7	87
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,7	10,7	13,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	5	7	9
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	7	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	36,9	40,2	37,4
Вміст олії, %	23,1	20,5	21,5
Блок (група стиглості)	6	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.