

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 20045025 Назва сорту: Славна Заявник (код): 1669 Власник сорту (код): 1669

Дата пріоритету: 16.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.01.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230175

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,49	2,90	2,80
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,63	-0,21	-0,08
+, - до усередненої урожайності, %	33,9	-6,8	-2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	114	118	127
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	142,2	166,2	146,3
Висота рослини, см	58,7	83,8	79,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,2	12,2	12,3
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	5
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	35,3	38,7	35,4
Вміст олії, %	24,3	21,5	22,8
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	вл	сл	вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.