

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea L. var. alba DC.***Заявка № 22096007 Назва сорту:** Феліссіма **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.02.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230224****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лиш для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лиш для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лиш для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лиш для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3	
2,2	Лиш для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лиш для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	пряме	1	
5,1	Лиш для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лиш для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лиш для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2	
8,1	Лиш для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лиш для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лиш для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лиш для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лиш для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
13	Лиш для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3	
15	Зовнішній листок: ступінь хвильості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	рівна	2	
19	Головка: за довжиною	коротка	3	
20	Головка: діаметр	малий	3	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лиш для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лиш сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоцианове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2	
29	Лиш сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	нештальна	3	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лиш сорти капусти білоголової. Час збиральної стигlosti	ранній	3	
33,2	Лиш сорти капусти червоноголової. Час збиральної стигlosti	ознака не визначається	0	
33,3	Лиш сорти капусти савойської. Час збиральної стигlosti	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягнання	ранній	3	
35	Чоловіча стерильність	наявна	9	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 50.Період від сівби до початку досягнання, діб – 65. Лежкість, балів (1–9) – 4. Вміст вітаміну С, мг % – 47; загального цукру, % – 4,5; сухої речовини, % – 8,1. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6; бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.