

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 15093003 Назва сорту: Мабел **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.02.2018 **Патент № 180003**

Дата пріоритету: 02.11.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.08.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171174

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0
3	Рослина: габітус	пряmostоячий	1
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	середнє	5
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
8	Стебло: опушення	слабке	3
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
11	Листкова пластинка: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Суцвіття: кількість квіток	від одної до трьох	1
14	Квітка: розмір	середній	5
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5
16	Плід: за довжиною	довгий	7
17	Плід: максимальний діаметр	малий	3
18	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7
19	Плід: основна форма	циліндрична	7
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
21	Плід: верхівка	загострена	4
22	Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною	відсутня або дуже мілка	1
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	відсутній або дуже слабкий	1
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки: Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7
26	Плід: глясуватість (як для 24)	помірна	5
27	Плід: плямистість	відсутня	1
28	Плід: смугастість	відсутня	1
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	сильна	7
35	Плід: розмір чашечки	середній	5
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	наявне	9
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	помірна	5
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1
39	Плід: зморшуватість чашечки	слабка	3
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричневе	4
42	Час початку цвітіння	середній	5
43	Час фізіологічної стиглості	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 210 т/га. Період від сівби до початку досягання – 95 діб. Період плодоношення – 140 діб. Вміст сухої речовини в плодах – 8,1 %. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): попелиці (*Aphidinea*) – 7. Стійкість проти хвороб, бал (1–9): вірусні хвороби (*Pseudomonas solanacearum* (Sm.) Berg.; *Fusarium* sp.; *Verticillium albo-atrum* Reincke et Berthold) – 8; гнилі (*Phomopsis vexans* Hart.; *Botrytis cinerea* Pers.; *Sclerotium Rolfsii* Sacc.) – 8; макроспоріоз (*Macrosporium solani* Ell. et Mart.) – 7; фітофтороз (*Phytophthora infestans* D.B.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.