

**Вид:** Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

**Заявка № 12013014 Назва сорту:** Камаро **Заявник (код):** 215 **Власник сорту (код):** 215

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 29.03.2018 **Патент № 180005**

**Дата пріоритету:** 17.12.2012

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.06.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 160820**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5
9	Листкова пластинка: колір	в основному зелений	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи	вузький	3
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	пурпуровий	4
16	Коренеплід: заглибленість у ґрунті	середня	5
17	Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина / ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма основи	округла	2
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 28 т/га, маса товарного коренеплоду – 200 г, тривалість періоду від повних сходів до початку досягання – 70 діб, вміст сухої речовини в плоді – 20 %, вміст загального цукру – 12 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.