

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 20045068 Назва сорту:** Зміна **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

**Дата пріоритету:** 01.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.03.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230316**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжена	3	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,61	3,15	2,50
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,75	0,04	-0,38
+, - до усередненої урожайності, %	40,3	1,3	-12,2
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	115	126	137
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	144,4	176,8	143,5
Висота рослини, см	60,2	79	82,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,9	15	14,8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	7	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	5
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	40	41,7	38,2
Вміст олії, %	21,3	19,3	20,3
Блок (група стиглості)	7	7	8
Напряма використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	сл	сл	сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.