

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 19045024 Назва сорту:** Одеситка **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

**Дата пріоритету:** 28.11.2019

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.03.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230315**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,86	3,11	2,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,40	2,90	2,43
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,54	-0,21	-0,45
+, - до усередненої урожайності, %	29,0	-6,8	-14,5
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,08	0,09
Тривалість періоду вегетації, дб	116	123	136
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	165,2	181	148,2
Висота рослини, см	74	83,5	90,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13,3	12,5	13,3
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	42,2	42	38,2
Вміст олії, %	19	19,3	20,3
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	сбіл	сбіл	сбіл
Якість	сл	сл	сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**