

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 21101008 Назва сорту: Лавендер **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.03.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230273

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|-----------------------------|-----|--------------------|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія | наявне | 9 | |
| 2 | Рослина: за висотою (за збирання) | середня | 5 | |
| 3 | Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка) | коротке | 3 | |
| 4 | Листок: положення | напівпряме | 3 | до горизонтального |
| 5 | Листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 6 | Листок: за шириною | середній | 5 | до широкого |
| 7 | Листок: відношення ширина/довжина | середнє | 5 | до великого |
| 8 | Листок: часточковість | наявна | 9 | |
| 9 | Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є) | сіро-зелене | 2 | |
| 10 | Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9) | помірна | 5 | до сильної |
| 11 | Листок: закручування верхівки | слабке | 3 | до помірного |
| 12 | Листок: форма поперечного перерізу | увігнута | 1 | |
| 13 | Листок: пухирчатість | слабка | 3 | до помірної |
| 14 | Листок: гофрованість біля головної жилки | слабка | 3 | |
| 15 | Листок: хвилястість краю | слабка | 3 | |
| 16 | Головка: покриття внутрішніми листками | частково покрита | 2 | |
| 17 | Головка: за висотою | середня | 5 | |
| 18 | Головка: діаметр | середній | 5 | |
| 19 | Головка: форма позаддовжнього розрізу | поперечно помірно-еліптична | 3 | |
| 20 | За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю | помірне | 5 | |
| 21 | Головка: забарвлення | фіолетове | 5 | |
| 22 | Головка: горбкуватість | помірна | 5 | |
| 23 | Головка: текстура | помірна | 5 | |
| 24 | Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості | наявне | 9 | |
| 25 | Квітка: забарвлення | жовте | 2 | |
| 26 | Скоростиглість: за весняного садіння | ознака не визначалась | 0 | |
| 27 | Скоростиглість: за літнього садіння | середній осінній тип | 5 | |
| 28 | Чоловіча стерильність | повна | 3 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 12. Товарна врожайність, т/га – 8. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 75. Період плодоношення, діб – 12. Вміст білка, % – 2,3; вітаміну С, мг % – 175; загального цукру, % – 4,8; сухої речовини, % – 11,8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6; бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.