

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 19040051 Назва сорту: НС Від **Заявник (код):** 1978 2549 **Власник сорту (код):** 1978 2549

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.05.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230358

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	до довгих
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	до довгої
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	до довгого
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,31	3,42	2,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,53	3,09	2,38
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,22	-0,33	-0,26
+, - до усередненої урожайності, %	9,5	-9,6	-7,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	290	303	313
Висота рослини, см	124,1	128,6	133,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	5,6	5,4
Вміст білка, %	20,1	18,8	19
Вміст олії, %	45,7	47,2	46,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	6	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	6	8	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	6	7	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	8	5
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	7	6
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.