

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 21040042 Назва сорту: ПХ141 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230482

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,86	3,38	3,50
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,26	-0,09	0,63
+, - до усередненої урожайності, %	10,0	-2,6	22,0
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	309
Висота рослини, см	120,3	126,7	127,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,1	4,6	4,9
Вміст білка, %	19,3	17,1	17,5
Вміст олії, %	47,6	49,4	49,2
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,5	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	7	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	6	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.