

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 21040026 Назва сорту: Том **Заявник (код): 2547 Власник сорту (код): 2547**

Дата пріоритету: 12.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230531

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,04	3,21	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,77	3,66	3,53
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,73	0,45	1,05
+, - до усередненої урожайності, %	35,8	14,0	42,3
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,14	0,14
Тривалість періоду вегетації, днів	295	312	308
Висота рослини, см	135,2	123,2	132
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,4	5,1	5,3
Вміст білка, %	19,3	17,2	17
Вміст олії, %	47,5	49,2	49,3
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,8	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	6	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	4	4	4
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.