

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 20040065 Назва сорту:** ХАННЕЛІ **Заявник (код):** 2255 **Власник сорту (код):** 2255

**Дата пріоритету:** 27.10.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.08.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230491

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	до довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	до довгого
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби	ознака не визначається	0	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,16	3,81	3,31
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,56	0,34	0,44
+, - до усередненої урожайності, %	21,5	9,8	15,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	313	308
Висота рослини, см	134	139	148,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	4,9	5,2
Вміст білка, %	19,2	17	17,9
Вміст олії, %	47,3	49,3	48,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкостролатів, %	0,6	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	6	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	6
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**