

Вид: Вігна спаржева *Vigna unguiculata* (L.) Walp. subsp. *sesquipedalis* (L.) Verdc.

Заявка № 23493001 Назва сорту: Кафедральна **Заявник (код):** 350 **Власник сорту (код):** 350

Дата державної реєстрації майнових прав: 10.08.2023 **Патент № 230332**

Дата пріоритету: 11.05.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230516

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сходи: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Рослина: кількість гілочок (за повного розвитку)	багато	7	
3	Рослина: за довжиною головного стебла (за підтримання)	коротке	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5	
5	Листок: верхівковий листочок за довжиною	довга	7	
6	Листок: верхівковий листочок за шириною	середня	5	
7	Черешок: за довжиною	середній	5	
8	Квітковий пуп'янок: забарвлення	жовтуватий	1	
9	Час першого цвітіння	ранній	3	
10	Квітка: забарвлення	світло-рожевувато-пурпурова	2	
11	Біб: за довжиною	довгий	7	
12	Біб: за шириною	вузкий	3	
13	Біб: скручування	наявна	9	
14	Біб: характер поверхні	помірно шерехата	2	
15	Біб: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
16	Лише сорти з відсутнім антоціановим забарвленням. Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3	
17	Лише сорти з наявним антоціановим забарвленням. Біб: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
18	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
19	Насінина: за довжиною	середня	5	
20	Насінина: за шириною	середня	5	
21	Насінина: форма	ниркоподібна	2	
22	Насінина: основне забарвлення	рожево-червоний	4	
23	Насінина: наявність вторинного забарвлення	наявний	9	
24	Насінина: вторинне забарвлення	коричневий	1	
25	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	по жилках	2	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність зелених бобів, т/га – 10,4. Тривалість періоду вегетації, діб – 95. Висота рослин, см – 48,5. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 9. Вміст сирого протеїну, % – 3,2. Маса 1000 насінин, г – 182. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta pisi* Libert.) – 9; антракноз (*Colletotrichum Lindemuthianum* Br. et. Cav.) – 9; бактеріоз (*Corynebacterium flaccumfaciens* (Hedges) Dowson.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.