

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 23120002 Назва сорту: Ботгас Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав: 07.08.2023 Патент № 230331

Дата пріоритету: 06.04.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230374

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	малі	3	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	роздільний	2	
7	Рослина: діаметр	малий	3	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	відсутній або слабкий	1	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю	напівпряме	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	ознака не визначалась	0	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0	
18	Листок: забарвлення	ознака не визначалась	0	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначалась	0	
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	тільки дифузний	1	
24	Листок: глясуватість верхнього боку	сильна	7	
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявна	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	мілка	3	
30	Листок: щільність надрізаності краю	нещільна	3	
31	Листок: за типом надрізаності	городчастий	1	
32	Листок: жилкування	віялоподібне	2	
33	Пазушне галузнення	сильне	7	
34	Час збиральної стиглості	ознака не визначалась	0	
35	Час початку стрілкування	середній	5	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	дуже слабка	1	
39	Стойкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стойкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	наявна	9	
41	Стойкість проти попелиць <i>Nasonovia ribis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стойкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	ознака не визначалась	0	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	червонуватий	1	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	мала	3	
45	Листок: кількість розчленувань	середня	5	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	ознака не визначалась	0	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	середні	5	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	велика	7	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначалась	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоти	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25,4. Тривалість періоду до досягання, днів – 31. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8; борошниста роса – 7; біла гниль – 7; септоріоз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.