

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 23120003 Назва сорту: Чепмен **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230375

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Насінина: забарвлення | чорне | 3 | |
| 2 | Сіянець: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 3 | Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку) | ознака не визначалась | 0 | |
| 4 | Сіянець: форма сім'ядолей | ознака не визначалась | 0 | |
| 5 | Листок: положення у стадії 10–12 листків | напівпряме | 3 | |
| 6 | Листок: за цілісністю (як для 5) | розчленований | 3 | |
| 7 | Рослина: діаметр | середній | 5 | |
| 8 | Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків | відсутній або слабкий | 1 | |
| 9 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків | ознака не визначається | 0 | |
| 10 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю | ознака не визначається | 0 | |
| 11 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір | ознака не визначається | 0 | |
| 12 | Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків | ознака не визначається | 0 | |
| 13 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі | ознака не визначається | 0 | |
| 14 | Листок: за товщиною | тонкий | 3 | |
| 15 | Листок: положення зовнішніх листків за збиральної стиглості | напівпряме | 3 | |
| 16 | Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма | широко ромбоподібна | 8 | |
| 17 | Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки | гостра | 1 | |
| 18 | Листок: забарвлення | зелене | 1 | |
| 19 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 20 | Листок: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 21 | Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 22 | Листок: поширення антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 23 | Листок: тип поширення антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 24 | Листок: глясуватість верхнього боку | помірна | 5 | |
| 25 | Листок: пухирчастість | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 26 | Листок: розмір пухирців | ознака не визначається | 0 | |
| 27 | Листок: хвилястість краю | помірна | 5 | |
| 28 | Листок: надрізаність краю верхньої частини листка | наявна | 9 | |
| 29 | Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною | глибока | 7 | |
| 30 | Листок: щільність надрізаності краю | помірна | 5 | |
| 31 | Листок: за типом надрізаності | правильно зубчастий | 2 | |
| 32 | Листок: жилкування | віялоподібне | 2 | |
| 33 | Пазушне галуження | слабке | 3 | |
| 34 | Час збиральної стиглості | середній | 5 | |
| 35 | Час початку стрілкування | ранній | 3 | |
| 36 | Рослина: за висотою (під час квітання) | ознака не визначалась | 0 | |
| 37 | Рослина: фасціація (під час квітання) | наявна | 9 | |
| 38 | Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітання) | дуже слабка | 1 | |
| 39 | Стойкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU | наявна | 9 | |
| 40 | Стойкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II | відсутня | 1 | |
| 41 | Стойкість проти попелиць <i>Nasonovia ribis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0 | наявна | 9 | |
| 42 | Стойкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1 | ознака не визначалась | 0 | |
| 43 | Листок: відтінок антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 44 | Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків | ознака не визначалась | 0 | |
| 45 | Листок: кількість розчленувань | ознака не визначалась | 0 | |
| 46 | Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі | ознака не визначалась | 0 | |
| 47 | Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 48 | Листок: площа антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 49 | Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків | ознака не визначалась | 0 | |
| 50 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 51 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 52 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі | ознака не визначається | 0 | |
| 53 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 54 | Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті | ознака не визначається | 0 | |

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 29,4. Тривалість періоду до досягання, діб – 32. Стойкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8; борошниста роса – 7; біла гниль – 7; септоріоз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.