

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 21019005 Назва сорту:** АРТЕМ **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.09.2023 **Патент №** 230494**Дата пріоритету:** 12.04.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.09.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230648**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Пропорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим пропорцевим листком	мала	3	
6	Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізні	7	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	короткий	1	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски та остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опущення центральної борідки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алійронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опущення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	C	L	P
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,51	6,58	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,22	7,59	7,06
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,71	1,01	0,44
+,- до усередненої урожайності, %	31,0	15,3	6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,25	0,20	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб	263	266	256
Висота рослини, см	85,6	87,7	87,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,5	51,5	46,5
Вміст білка, %	11,9	12	11,4
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурої тржі, бал	9	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.